



Příbalová informace

dolo-angin

Pastilky bez cukru

12 nebo 24 pastilek bez cukru

Složení:

1 pastilka obsahuje:

Lichen Islandicus 50 mg
Benzokain 10 mg

Kyselina vinná 15 mg, isomalt, přírodní barvivo: měďnatý komplex chlorofylu, aromatické látky.

Léková forma a velikost balení:

Původní balení obsahuje 12 nebo 24 pastilek

Terapeutické indikace:

Při silných bolestech v krku a podrážděné sliznici.

Použití:

Dospělí a děti (12 let a více): Pokud není předepsáno jinak, dospělí a děti od 12 let si nechají každé 2-3 hodiny pomalu rozpustit jednu pastilku v ústech. Maximální denní dávka je 6 pastilek.
Nevhodné pro děti. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Upozornění před použitím:

Pokud bolesti přetrvávají déle než 2-3 dny, vyhledejte, prosím, Vašeho lékaře, protože při některých původcích onemocnění může být potřebná doplňková terapie antibiotiky. **Prosím, nepoužívejte tento přípravek, pokud jste přecitlivělí na některou složku tohoto přípravku.**

Co musíte vědět, pokud jste těhotná nebo kojíte?

O použití tohoto přípravku v těhotenství a při kojení nejsou dostatečné údaje. Proto se tento přípravek nesmí v těhotenství a při kojení používat.

Upozornění pro diabetiky: 1 pastilka *dolo-anginu* odpovídá 0,13 BE (oslageno isomaltem).

***dolo-angin*: aktivní a účinný proti bolesti v krku a podráždění sliznice.**

***dolo-angin* bojuje proti bolesti v krku dvojím způsobem. Při tom se uplatňují dva fyzikální účinky.**

Lichem islandicus uklidňuje zánětem postiženou a podrážděnou sliznici dutiny ústní a nosohltanu. Kryje vysušenou sliznici a tím brání průniku původců onemocnění. Takto chráněné sliznice se mohou lépe a rychleji regenerovat.

Benzokain kryje povrch zánětem postižených buněk jako ochranný film a tím odstraňuje pocit bolesti. Benzokain tak rychle a účinně zmírňuje bolesti přesně tam, kde vznikají.

Díky témtu dvěma mechanismům se může zánětem postižená sliznice poměrně bezbolestně vyléčit.

dolo-angin pastilky se ve Vašich ústech rozpustí přibližně za 12 minut. Během této doby se aktivní látky mohou velmi dobře rozptýlit v dutině ústní.

V dutině ústní může dojít k projevům zvýšené citlivosti až přecitlivělosti.

Doba použitelnosti:

Doba použitelnosti tohoto balení je vytiskněna na vnějším obale a na blistru. Přípravek se nesmí používat po uplynutí doby použitelnosti.

Poslední revize: Listopad 2006



Zdravotnický prostředek

Výrobce

MPC International S.A.
26, Boulevard Royal
2449 Luxembourg

**DIVAPHARMA GmbH,
D-12274 Berlin
A company of the Klosterfrau group.
www.klosterfrau.com**