

## PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA

**Otrivin Menthol 1 mg/ml nosní sprej, roztok**

xylometazolin-hydrochlorid

**Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.**

- Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 7 dnů nebudecítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

**Co naleznete v této příbalové informaci:**

1. Co je Otrivin Menthol a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Otrivin Menthol používat
3. Jak se Otrivin Menthol používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Otrivin Menthol uchovávat
6. Obsah balení a další informace

### 1. CO JE OTRIVIN MENTHOL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Otrivin Menthol se používá k obnovení průchodnosti ucpaného nosu způsobeného akutní rýmou, sennou rýmou nebo jinou alergickou rýmou či zánětem vedlejších nosních dutin.

Otrivin Menthol se dále může používat na doporučení lékaře při zánětu středního ucha, kdy pomáhá snížit prosáknutí sliznice nosohltanu. Váš lékař Vám ho také může předepsat pro použití před odborným vyšetřením nosu.

Otrivin Menthol 1 mg/ml obsahuje léčivou látku xylometazolin-hydrochlorid. Ta rychle snižuje prosáknutí sliznice ucpaného nosu a pomáhá odstranit nahromaděný hlen, takže můžete volněji dýchat nosem.

Účinek přípravku Otrivin Menthol nastupuje do 2 minut a trvá až po dobu 12 hodin. Je dobré snášen i pacienty s citlivou nosní sliznicí.

Otrivin Menthol je určen pro dospělé a dospívající od 12 let.

### 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE OTRIVIN MENTHOL POUŽÍVAT

**Nepoužívejte Otrivin Menthol:**

- jestliže jste alergický(á) na xylometazolin-hydrochlorid nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);
- jestliže jste podstoupil(a) nitrolební operaci odstranění podvěsku mozkového (hypofýzy) prováděnou

- přes nosní dutinu nebo operaci tvrdé pleny mozkové;
- jestliže máte zelený oční zákal s úzkým úhlem;
- jestliže máte suchý zánět nosní sliznice, který se projevuje pocitem sucha a šimráním v nose často provázeným drobným krvácením po odloučení zaschlých strupů.

### **Upozornění a opatření**

Otrivin Menthol může u velmi citlivých pacientů způsobit poruchy spánku, závratě, třes, poruchy srdečního rytmu nebo zvýšení krevního tlaku. Obrat'te se na svého lékaře, pokud Vás takové příznaky obtěžují.

**Nepoužívejte Otrivin Menthol déle než 7 po sobě jdoucích dnů.** Pokud se do 7 dnů nebudecítit lépe nebo pokud se Vám přitízí, musíte se poradit s lékařem. Dlouhodobé nebo nadměrné používání může způsobit opětovné upcání nosu nebo jeho zhoršení či ztenčení nosní sliznice.

Otrivin Menthol není určen k podání do očí nebo do úst.

### **Před použitím přípravku Otrivin Menthol se porad'te se svým lékařem, jestliže:**

- máte vysoký krevní tlak;
- máte onemocnění srdce a cév;
- trpíte chorobou srdce (např. syndromem dlouhého QT intervalu);
- máte zvýšenou činnost štítné žlázy;
- máte cukrovku;
- máte zvětšenou prostatu;
- máte feochromocytom (nezhoubný nádor dřeně nadledvin, který produkuje vysoké hladiny epinefrinu a norepinefrinu (adrenalinu a noradrenalinu), což způsobuje zvýšení krevního tlaku);
- užíváte nebo jste v předchozích dvou týdnech užíval(a) některá antidepresiva (přípravky k léčbě deprese) známá jako inhibitory monoaminoxidázy (IMAO);
- užíváte tricyklická nebo tetracyklická antidepresiva.

Pokud se Vás týká kterákoli z výše uvedených skutečností, porad'te se se svým lékařem.

### **Děti**

Otrivin Menthol není určen pro děti mladší 12 let.

### **Další léčivé přípravky a Otrivin Menthol**

Informujte svého lékaře nebo lékárničku o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

V případě, že užíváte nebo jste v předchozích dvou týdnech užíval(a) léky k léčbě deprese zvané inhibitory monoaminoxidázy (IMAO), porad'te se před použitím přípravku Otrivin Menthol se svým lékařem.

V případě, že užíváte léky k léčbě deprese zvané tricyklická nebo tetracyklická antidepresiva, porad'te se před použitím přípravku Otrivin Menthol se svým lékařem.

### **Těhotenství a kojení**

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, porad'te se se svým lékařem nebo lékárničkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Nepoužívejte Otrivin Menthol, pokud jste těhotná.

Pokud kojíte, porad'te se o vhodnosti používání přípravku Otrivin Menthol se svým lékařem.

### **Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů**

Otrivin Menthol nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

### **3. JAK SE OTRIVIN MENTHOL POUŽÍVÁ**

Vždy používejte Otrivin Menthol přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poradte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

#### **Dospělí a dospívající od 12 let**

Jeden vstřik do každé nosní dírky jednou až třikrát denně dle potřeby. Nepřekračujte celkem 3 aplikace do každé nosní dírky denně. Poslední denní dávku se doporučuje podat krátce před ulehnutím na lůžko.

Pumpička ovládaná svisle dvěma prsty; Freepod

#### **Způsob podání**

1. Nestříhejte nástavec dávkovací pumpičky. Dávkovací pumpička spreje je připravena k prvnímu použití.



2. Vyprázdněte si nos.
3. Odstraňte ochranný kryt.
4. Před prvním použitím naplňte dávkovač jeho čtyřnásobným stlačením, dokud není jeden vstřik uvolněn do vzduchu. Tako připravený dávkovač zůstane naplněn pro každodenní pravidelné použití. Pokud nedojde k vystříknutí spreje po uvedení pumpičky do činnosti nebo pokud se přípravek nepoužíval po dobu delší než 6 dnů, pumpičku je třeba znova připravit na uvedení do chodu čtyřnásobným stlačením dávkovače.
5. Dávejte pozor, abyste si sprej nevstříkl(a) do očí nebo do úst.
6. Lahvičku držte svisle s tryskou mířící nahoru s palcem přitisknutým na dně lahvičky a tryskou mezi dvěma prsty.



7. Mírně předkloňte hlavu a vložte trysku do nosní dírky.
8. Stlačte jednou pumpičku a současně se zlehka nadýchněte nosem.



9. Opakujte u druhé nosní dírky.
10. Před nasazením krytu očistěte a osušte použitou trysku.
11. Lahvičku má používat pouze jedna osoba, aby se zabránilo možnému přenosu infekce.

Pumpička ovládaná palcem z boku; Khone

**Způsob použití:**

Sejměte uzávěr.

**Před prvním použitím**

Stlačte pumpičku 5krát, aby došlo k jejímu naplnění. Jakmile se pumpička naplní, vydrží naplněná po celou dobu pravidelného denního ošetření.

1. Vyprázdněte nos.
2. Lahvičku držte svisle s palcem na spouštěcím tlačítku.
3. Aby nedocházelo k odkapávání, zůstaňte ve vzpřímené poloze a vložte trysku do nosní dírky.
4. Stiskněte tlačítko pro vstříknutí a současně se zvolna nadechněte nosem.  
Tento postup (kroky 2 až 4) opakujte u druhé nosní dírky.
5. Po každém použití očistěte a osušte trysku.
6. Nasaděte ochranný uzávěr zpět, dokud neuslyšíte „cvaknutí“.



V případě, že sprej není vystříkován po celou dobu stlačení nebo pokud nebyl přípravek používán po dobu delší než 7 dní, musí být pumpička znova naplněna 2 stlačeními.

Pokud nedojde k aplikaci celé dávky, dávka se nemá opakovat.

Lahvičku má používat pouze jedna osoba, aby se zabránilo možnému přenosu infekce.

**Jestliže jste použil(a) více přípravku Otrivin Menthol, než jste měl(a)**

Jestliže jste použil(a) více přípravku Otrivin Menthol, než jste měl(a), nebo došlo k náhodnému požití, okamžitě informujte lékaře.

**Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Otrivin Menthol**

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

#### 4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

**Přestaňte používat Otrivin Menthol a vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc**, pokud se u Vás nebo Vašeho dítěte vyskytnou následující příznaky alergické reakce:

- obtíže s dýcháním nebo polykáním;
- otok obličeje, rtů, jazyka nebo krku;
- závažné svědění kůže s červenající vyrážkou.

**Časté nežádoucí účinky** (mohou postihnout až 1 pacienta z 10):

- podráždění nebo suchost sliznice nosu, pocit na zvracení, bolest hlavy, místní pocit pálení.

**Méně časté nežádoucí účinky** (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100):

- krvácení z nosu

### **Velmi vzácné nežádoucí účinky** (mohou postihnout až 1 pacienta z 10 000):

- alergické reakce (otok na různých místech těla, kožní vyrážka, svědění), přechodné poruchy vidění, nepravidelná nebo rychlá činnost srdce.

### **Hlášení nežádoucích účinků**

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: [www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek](http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek)

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

## **5. JAK OTRIVIN MENTHOL UCHOVÁVAT**

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce za výrazem „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

## **6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE**

### **Co Otrivin Menthol obsahuje**

- Léčivou látkou je xylometazolin-hydrochlorid.  
Jeden ml roztoku obsahuje 1 mg xylometazolin-hydrochloridu.
- Jeden vstřík obsahuje 0,14 mg xylometazolin-hydrochloridu.
- Pomocnými látkami jsou dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, dodekahydrtát hydrogenfosforečnanu sodného, chlorid sodný, dinatrium-edetát, levomenthol, cineol, sorbitol, hydrogenricinomakrogol 2000, čištěná voda.

### **Jak Otrivin Menthol vypadá a co obsahuje toto balení**

Otrivin Menthol je opalescentní, bílý roztok s mentholovou vůní.

Pumpička ovládaná svisle dvěma prsty; Freepod

Otrivin Menthol je dostupný jako 10 ml nosní sprej v lahvičce s dávkovací pumpičkou a aplikátorem s ochranným uzávěrem.

Pumpička ovládaná palcem z boku; Khone

Otrivin Menthol je dostupný jako 10 ml nosní sprej s dávkovací pumpičkou ovládanou palcem z boku s ochranným uzávěrem.

### **Držitel rozhodnutí o registraci**

Haleon Czech Republic s.r.o.

Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4 - Nusle, Česká republika

e-mail: [mystory.cz@haleon.com](mailto:mystory.cz@haleon.com)

### **Výrobce**

Haleon Germany GmbH, Barthstrasse 4, 80339 Mnichov, Německo

**Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 16. 9. 2024**