

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO PACIENTA NA OBALU

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Urologická čajová směs

Léčivý čaj

Perorální podání

SLOŽENÍ

Betulae folium (březový list) 450 mg, *Uvae ursi folium* (medvědicový list) 450 mg, *Menthae piperitae herba* (nať máty peprné) 225 mg, *Ononidis radix* (jehlicový kořen) 150 mg, *Petroselinii radix* (petrželový kořen) 150 mg, *Herniariae herba* (průtržníková nať) 75 mg v 1,5g nálevovém sáčku.

POUŽITÍ

Tradiční rostlinný léčivý přípravek užívaný jako doplňková léčba při akutních infekčních chorobách močových cest, které se projevují pálením při močení a častým močením.

Přípravek mohou užívat dospívající od 12 let a dospělí.

Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

PŘÍPRAVA A DÁVKOVÁNÍ

1 nálevový sáček se přelije 0,25 l vroucí vody a nechá se 5 - 10 min vyluhovat v zakryté nádobě. Nesmí se vařit. Čaj se pije teplý, neslazený 3 – 5x denně. Účinek je možno zvýšit přidáním malého množství jedlé sody (na špičku nože do šálku). Připravuje se vždy čerstvý, bezprostředně před použitím.

Pokud se do 7 dní nebudete cítit lépe nebo se Vám přitíží, poradte se s lékařem. Bez porady s lékařem přípravek užívejte nejdéle 1 týden. Léčbu je možno opakovat nejvýše 5x do roka.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívejte při přecitlivělosti na léčivé látky přípravku, otocích způsobených nedostatečnou funkcí srdce a ledvin, v době těhotenství a kojení. Nepodávejte dětem do 12 let.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

U citlivých osob možnost podráždění žaludku projevující se nevolností, zvracením nebo průjmem. Gastroezofageální reflux (návrat žaludečního obsahu zpět do jícnu) se může zhoršit a mohou zesílit obtíže s pálením žáhy.

Dále se mohou objevit alergické reakce (svědění, vyrážka, kopřivka, alergická rýma).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41, Praha 10, webové stránky:

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucího účinku můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

INTERAKCE

Nepodávejte s léky a potravou snižujícími pH moče (zvyšující kyselost moči - např. kyselé šťávy, káva, léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou, apod.).

UPOZORNĚNÍ

Přípravek byste neměl(a) užívat, pokud trpíte gastroezofageálním refluxem (návrat žaludečního obsahu zpět do jícnu, projevující se pálením žáhy), neboť Vaše potíže mohou zesílit.

Pokud se u Vás během užívání přípravku objeví krev nebo hnis v moči, bolest v podbřišku nebo horečka, poraďte se s lékařem.

Při žlučových kamenech či jiných onemocněních žlučových cest je vhodné konzultovat užívání čaje s lékařem.

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „Použitelné do“. Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

VELIKOST BALENÍ

30 g, 20 nálevových sáčků á 1,5 g s PP přebalem i bez přebalu

22,5 g, 15 nálevových sáčků á 1,5 g s PP přebalem

15 g, 10 nálevových sáčků á 1,5 g s PP přebalem

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

94/964/95-C

Č. ŠARŽE

POUŽITELNÉ DO

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A VÝROBCE

Megafyt Pharma s.r.o., U Elektrárny 516, 252 46 Vrané nad Vltavou, Česká republika

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU NA OBALU

UROLOGICKÁ ČAJOVÁ SMĚS

DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU

8.4.2015