

**TUGI**

Model 2

tugi.cz



VIDEO MANUÁL

Název a typ:  
**Aplikátor TUGI Model 2**  
Zdravotnický prostředek  
pro subkutánní aplikaci injekcí.

- Aplikátor je vyroben ze silikonové směsi.
- Hloubka vpichu: 12 mm (plná délka jehly).
- Doporučená rychlosť aplikace léku, tedy stlačování pístu směrem dolů, je 10 až 15 sekund.
- Pro udržení hygienické bezpečnosti doporučujeme dezinfekci TUGI aerosolovým nealkoholovým dezinfekčním prostředkem před každým jeho použitím. TUGI je možné také očistit teplou tekoucí vodou. V případě silného znečištění je možné aplikátor očistit ponovením do vroucí vody.
- Aplikátor je určen pro dospělé. Aplikátor není určen pro děti.
- Skladujte při teplotě (T: +4 °C až +35 °C)

Aplikátor je vhodný výhradně pro tyto předplňené injekční stříkačky:


Injekce s automatickým bezpečnostním systémem typu ERIS™

- CLEXANE 2000IU(20MG)/0,2ML
- CLEXANE 4000IU(40MG)/0,4ML

Injekce s bezpečnostním krytem jehly

- FRAXIPARINE 9500IU/ML  
v provedení 0,3ML, 0,4ML, 0,6ML, 0,8ML, 1,0ML
- FRAXIPARINE FORTE 19000IU/ML  
v provedení 0,6ML, 0,8ML, 1,0ML

Použití injekční stříkačky se musí likvidovat jako nebezpečný odpad vložením do likvidační nádobky specificky určené pro nebezpečný odpad. viz. Pokyny k použití aplikátoru TUGI.



### Určený účel použití

Aplikátor TUGI je zdravotnický prostředek určený výhradně k aplikaci předplňených injekčních stříkaček, určených k subkutánnímu podání léků. Usnadňuje a podporuje bezpečnou manipulaci s injekční stříkačkou během aplikace léčivého přípravku.

Aplikátor TUGI je zdravotnický prostředek třídy I bez měřící funkce, určený pro opakované použití.

### Upozornění

**Aplikátor je vhodný výhradně pro tyto předplňené injekční stříkačky:**

Injekce s automatickým bezpečnostním systémem typu ERIS™

- CLEXANE 2000IU(20MG)/0,2ML
- CLEXANE 4000IU(40MG)/0,4ML

Injekce s bezpečnostním krytem jehly

- FRAXIPARINE 9500IU/ML  
v provedení 0,3ML, 0,4ML, 0,6ML, 0,8ML, 1,0ML
- FRAXIPARINE FORTE 19000IU/ML  
v provedení 0,6ML, 0,8ML, 1,0ML

Při použití s jiným, než uvedeným typem léků může dojít k chybnému podání léčivé dávky nebo aplikaci.

Životnost aplikátoru TUGI je 5 let od data výroby uvedeném na obalu aplikátoru.

### Obsah balení

**1 Aplikátor TUGI** – zdravotnický prostředek pro subkutánní aplikaci injekcí.

**2 Leták s návodem k použití.**

+35 °C omezení teploty (T: +4 °C až +35 °C)  
 - chránit před slunečním světlem

čtěte návod k použití

### Výrobce:


PROMOTON s.r.o. | Tleskačova 17 | 323 00 Plzeň | CZ  
[www.tugi.cz](http://www.tugi.cz)

# Pokyny k použití aplikátoru TUGI s lékem Clexane


Pro použití aplikátoru s lékem Clexane postupujte dle níže uvedených pokynů.



Obratěte TUGI aplikátor hřbetem dolů, tím se vám zpřístupní správný otvor pro vložení injekční stříkačky s lékem **Clexane**.



Volně uchopte TUGI aplikátor do dlaně a spusťte injekční stříkačku do centrálního kanálku TUGI aplikátoru tak, aby směřovala krytem jehly dolů. Na detailu vpravo vidíte polohu správně vložené stříkačky s lékem Clexane.




**DŮLEŽITÉ!** **Zkontrolujte úchop.** Lehce stiskněte TUGI. Tím dojde k bezpečnému zafixování stříkačky i celého TUGI aplikátoru ve vaší dlaní. Ruka nesmí při úchopu TUGI omezovat plné využití opěrné plochy aplikátoru. Tato opěrná plocha musí být zcela volná. Pouze tak můžete pokračovat k bezpečnému provedení dalších kroků a aplikaci léku.


TUGI aplikátor držte pevně, ale relaxovaně tak, aby vám to bylo příjemné. Nechte TUGI silně mačkat.




Stále lehce, ale pevně držte TUGI aplikátor v dlani a druhou rukou opatrně sejměte kryt jehly, který odložte do předem připraveného kontejneru na nebezpečný odpad.




Ukazováčkem a palcem volné ruky vytvořte na předem vybraném místě vašeho těla vhodnou kožní/tukovou řasu. Vyvarujte se bolestivému stisku kůže.




Prověděte kontrolovaný vpich kolmo k pokožce. Při provedení vpichu musí opěrná plocha TUGI aplikátoru dosednout na vytvořenou kožní/tukovou řasu.



Aplikujte lék. Palcem zvolna a pomalu stlačujte píst stříkačky až do konce. Doporučená rychlosť aplikace celé dávky je 10 až 15 sekund. Po dokončení aplikace uslyšte cvaknutí, kdy dojde k aktivaci ochranného krytu jehly.




Po aplikaci celé dávky léku opatrně a kolmo zvedněte aplikátor z místa vpichu. Následně uvolněte kožní/tukovou řasu. Automaticky se vysune ochranný kryt jehly.




Povolte stisk TUGI aplikátoru a injekční stříkačku libovolně, ale vždy opatrně vyjměte z TUGI aplikátoru a odhodte do předem připraveného kontejneru na nebezpečný odpad.

# Pokyny k použití aplikátoru TUGI s lékem Fraxiparine


Pro použití aplikátoru s lékem Fraxiparine postupujte dle níže uvedených pokynů.



Injekční stříkačka s lékem **Fraxiparine** se vkládá do aplikátoru shora **do hřbetu slona**.




Volně uchopte TUGI aplikátor do dlaně a spusťte injekční stříkačku do centrálního kanálku TUGI aplikátoru tak, aby směřovala krytem jehly dolů. Na detailu vpravo vidíte polohu správně vložené stříkačky s lékem Fraxiparine.





**DŮLEŽITÉ!** **Zkontrolujte úchop.** Lehce stiskněte TUGI. Tím dojde k bezpečnému zafixování stříkačky i celého TUGI aplikátoru ve vaší dlaní. Ruka nesmí při úchopu TUGI omezovat plné využití opěrné plochy aplikátoru. Tato opěrná plocha musí být zcela volná. Pouze tak můžete pokračovat k bezpečnému provedení dalších kroků a aplikaci léku.

TUGI aplikátor držte pevně, ale relaxovaně tak, aby vám to bylo příjemné. Nemusíte TUGI silně mačkat.




Stále lehce, ale pevně držte TUGI aplikátor v dlani a druhou rukou opatrně sejměte kryt jehly, který odložte do předem připraveného kontejneru na nebezpečný odpad.





Prověděte kontrolovaný vpich kolmo k pokožce. Při provedení vpichu musí opěrná plocha TUGI aplikátoru dosednout na vytvořenou kožní/tukovou řasu.




Aplikujte lék. Palcem zvolna a pomalu stlačujte píst stříkačky až do konce. Doporučená rychlosť aplikace celé dávky je 10 až 15 sekund.



Po aplikaci celé dávky léku opatrně a kolmo zvedněte aplikátor z místa vpichu. Následně uvolněte kožní/tukovou řasu.



Stiskněte TUGI aplikátor pevně v dlani. Volnou rukou uchopte injekční stříkačku za plastový prsteneček, který se opírá o hřbet TUGI a plynule zatáhněte kolmo vzhůru.



Po správném vysunutí injekční stříkačky z aplikátoru uslyšte cvaknutí. Tím došlo k fixaci ochranného krytu jehly.

Povolte stisk TUGI aplikátoru a injekční stříkačku libovolně, ale vždy opatrně vyjměte z TUGI aplikátoru a odhodte do předem připraveného kontejneru na nebezpečný odpad.