

## PÍ SOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

### **Algesal**

Dermálny krém

### **Držiteľ rozhodnutia o registrácii**

Pharmaselect International Beteiligungs GmbH  
Ernst-Melchior-Gasse 20, 1020 Viedeň  
Rakúsko

## **Zloženie lieku**

### Liečivá:

Dietylamini salicylas 5 g (dietylaminiumsalicylát), Myrtecinum (myrtekain) 0,5 g v tube s 50 g.  
Dietylamini salicylas 10 g (dietylaminiumsalicylát), Myrtecinum (myrtekain) 1 g v tube so 100 g.

Pomocné látky: Macrogoli stearas (stearylmakrogol), acidum hydrochloricum (kyselina chlorovodíková), aroma lavandulae( levandulová aróma), aqua purificata (voda čistená).

### **Farmakoterapeutická skupina**

Lokálne antireumatikum.

### **Charakteristika**

Algesal obsahuje kombináciu liečiv, ktoré rôznymi spôsobmi urýchľujú procesy hojenia. Salicylát pôsobí proti bolesti, protizápalovo a znižuje opuch.

Myrtekain znižuje svalové napätie a spôsobuje lokálne znecitlivenie.

Liečivá sa rýchlo a úplne vstrebajú kožou a pôsobia priamo na postihnutú oblasť. Nástup účinku je rýchly.

### **Indikácie**

Reumatické bolesti svalov a kĺbov, pomliaždeniny, distorzie (vyvrtnutie kĺbu), natrhnutie svalov a šliach, väzov, výrony, zápal šliach a šlachových púzdiar, neuralgie.

### **Kontraindikácie**

Neodporúča sa užívať v prípade precitlivosti na salicyláty alebo na akúkoľvek zložku lieku.

Liek nesmie byť aplikovaný na porušenú kožu, napríklad na rany, popáleniny ani na sliznice.

### **Nežiaduce účinky**

Ojedinele môže vzniknúť kontaktná alergia spojená so svrbením, začervenaním alebo žihľavkou. V takom prípade je potrebné aplikáciu prerušiť.

O prípadných nežiaducich reakciách informujte svojho lekára.

### **Interakcie**

Nie sú známe.

Informujte svojho lekára o súbežnom užívaní iných liekov, vrátane voľnopredajných.

### **Dávkovanie a spôsob podávania**

Ak nie je lekárom predpísané inak, dávkovanie je nasledovné:

2-3 krát denne naniesť na postihnuté miesta krém v tenkej vrstve a ľahko ho votrieť do kože.

Ak sa do 4 dní ťažkosti nezmiernia, poraďte sa o ďalšom postupe s lekárom. Bez rady lekára nepoužívajte liek dlhšie ako 7 dní.

### **Špeciálne upozornenia:**

Pri podávaní počas ťarchavosti, u dojčiat a malých detí a u pacientov s poruchami obličkových funkcií je potrebné sa vyhnúť dlhodobej aplikácii na veľké plochy. Salicyláty predchádzajú do materského mlieka len v malej koncentrácii.

Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje je nepravdepodobné.

Športovcov je potrebné upozorniť, že liek obsahuje liečivo, ktoré môže spôsobiť pozitívny výsledok pri testoch vykonávaných počas antidopingovej kontroly.

Algesal sa nesmie nanášať na sliznice, očné sliznice, otvorené rany, ekzémy alebo zápalovo zmenenú pokožku. Pre zabránenie nežiaduceho kontaktu sa odporúča po aplikácii krému umyť ruky. Po otvorení tuby sa ochranná fólia prepichne hrotom na opačnom konci uzáveru.

#### **Varovanie**

Liek sa nesmie používať po uplynutí času použiteľnosti vyznačenom na obale.

#### **Balenie**

Tuba s 50 g a 100 g krému.

#### **Uchovávanie**

Skladovať pri teplote do 25 °C .

Liek uchovávať mimo dosahu a dohľadu detí.

#### **Dátum poslednej revízie**

Január 2012