

PÍ SOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV
GALCES tablety pre psy

**1. NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII
A DRŽITEĽA POVOLENIA NA VÝROBU ZODPOVEDNÉHO ZA UVOĽNENIE
ŠARŽE, AK NIE SÚ IDENTICKÍ**

PHARMAGAL spol. s r. o., Murgašova 5, 949 01 Nitra, Slovenská republika

2. NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU

GALCES tablety pre psy

3. ZLOŽENIE: ÚČINNÁ LÁTKA (LÁTKY) A INÉ ZLOŽKY

1 tableta obsahuje:

Účinné látky:

Praziquantelum	50,0 mg
Pyranteli pamoas	150,0 mg
Fenbendazolum	200,0 mg

Pomocné látky:

Tabletovacie prísady: magnéziumstearát, mastenec, mliečny cukor, zemiakový škrob

Svetložlté tablety s priemerom 13 mm a hmotnosťou 570 g.

4. INDIKÁCIE

Nematodózy a cestodózy psov spôsobené parazitmi *Toxocara canis* (dospelé a neskoré vývojové štádiá), *Toxascaris leonina*, *Ancylostoma caninum*, *Uncinaria stenocephala*, *Trichuris vulpis* (dospelé), *Echinococcus granulosus*, *Echinococcus multilocularis*, *Taenia spp.*, *Dipylidium caninum* (dospelé a vývojové štádiá).

5. KONTRAINDIKÁCIE

Neaplikovať súčasne s piperazínovými liekmi. Nepoužívať u psov mladších ako 2 týždne.

6. NEŽIADUCE ÚČINKY

Neboli pozorované.

7. CIEĽOVÝ DRUH

Pes

8. DÁVKOVANIE PRE KAŽDÝ DRUH, CESTA A SPÔSOB PODANIA LIEKU

Odporúčaná dávka je 5 mg prazikvantelu, 15 mg pyrantel pamoátu a 20 mg fenbendazolu na 1 kg ž. hm., čo sa rovná dávke 1 tableta na 10 kg živej hmotnosti.

Odporúča sa pravidelné odčervenie štyrikrát ročne.

9. POKYN O SPRÁVNOM PODANÍ

Liek sa podáva perorálne jednorazovo, vždy individuálne, buď na koreň jazyka alebo v obľúbenej potrave. Predchádzať poddávkovaniu z dôvodu nesprávneho stanovenia živej hmotnosti, resp. nesprávneho podania lieku.

10. OCHRANNÁ LEHOTA

Liek nie je určený pre potravinové zvieratá.

11. OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA UCHOVÁVANIE

Uchovávať pri teplote do 25°C, chrániť pred svetlom.

Uchovávať mimo dosahu detí.

Nepoužívať po dátume expirácie uvedenom na obale.

12. OSOBITNÉ UPOZORNENIA

Pre zabezpečenie plného účinku a bezpečnosti lieku je potrebné presne dodržiavať dávkovanie a spôsob aplikácie. Zvlášť pri gravidných sukách je potrebné presné dávkovanie. Rezistencia parazitov voči akejkoľvek skupine antihelmintík sa môže vyvinúť po častom, opakovanom použití antihelmintika príslušnej skupiny.

13. OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽITÉHO LIEKU ALEBO ODPADOVÉHO MATERIÁLU, V PRÍPADE POTREBY

Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z tohoto veterinárneho lieku musia byť zlikvidované v súlade s platnými predpismi.

14. DÁTUM POSLEDNÉHO SCHVÁLENIA TEXTU V PÍ SOMNEJ INFORMÁ CII PRE POUŽÍVATEĽOV

12/2014

15. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Interakcie:

Pyrantel pamoát pôsobí antagonisticky s piperazínovými liečivami.

Balenie:

Vrecko Alufan: 1x1 tbl., 5x1 tbl., 50x1 tbl., 100x1 tbl.

PVC blister: 4 x 1 tbl., 10 x 1 tbl., 5 x 10 x 1 tbl.

Nie všetky veľkosti balenia sa musia uvádzať na trh.

Len pre zvieratá.

Reg. č. SR: 96/011/01-S

Pokiaľ chcete získať informácie o tomto lieku, prosím kontaktuje príslušného reprezentanta držiteľa rozhodnutia o registrácii:

Slovenská republika:

PHARMAGAL s.r.o., Murgašova 5, 949 01 Nitra, Slovenská republika
tel:+421/37/7419 759, fax: +421/37/7419 758
www.pharmagal.sk, e-mail: pharmagal@seznam.cz