

PÍ SOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Ambrobene 15 mg/5 ml
(ambroxoli hydrochloridum)
sirup

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
ratiopharm GmbH, 89079 Ulm, SRN

Zloženie sirupu:

Liečivo:

ambroxoli hydrochloridum (ambroxol hydrochlorid) 15 mg v 5 ml sirupu.

Pomocné látky:

sorbitolum 70 % non cristallisabile (nekryštalizujúci sorbitol 70 %), aroma rubi idaei (malinová aróma), saccharinum (sacharín), propylenglycolum (propylénglykol), aqua purificata (čistená voda).

Farmakoterapeutická skupina:

Expektorans, mukolytikum.

Charakteristika:

Ambrobene 15 mg/5 ml je expektorans s mukolytickým účinkom, vyvoláva zvýšenú tvorbu hlienu a zároveň ho zriedňuje, podporuje pohyb riasiniek a tým čistí sliznicu dýchacích ciest.

Indikácie:

Liek Ambrobene 15 mg/5 ml sa užíva pri akútnych a chronických ochoreniach dýchacích ciest spojených s ťažkým vykašliavaním, pri infekčných ochoreniach dýchacích ciest. Ambrobene 15 mg/5 ml možno podávať deťom i dospelým.

Kontraindikácie:

Liek Ambrobene 15 mg/5 ml sa nesmie užívať pri precitlivenosti na ambroxol.

Počas gravidity užívajte liek len s vedomím lekára. Počas užívania lieku Ambrobene 15 mg/5 ml sa odporúča prerušiť dojčenie.

Nežiaduce účinky:

Počas užívania lieku Ambrobene 15 mg/5 ml sa môže prejaviť slabosť, bolesť hlavy, žalúdočné ťažkosti, hnačky a dávenie, kožné vyrážky. Pri výskyte týchto nežiaducich účinkov alebo iných nezvyčajných reakcií vyhľadajte svojho ošetrojúceho lekára.

Interakcie:

Účinky lieku Ambrobene 15 mg/5 ml a iných liekov užívaných súčasne sa môžu navzájom ovplyvňovať. V prípade, že užívate iné lieky na lekárske predpis alebo i bez neho, poraďte sa o vhodnosti užívať Ambrobene 15 mg/5 ml s lekárom. Ak vám ďalší lekár bude predpisovať nejaký iný liek, informujte ho, že užívate Ambrobene 15 mg/5 ml.

Látky tlmiace kašeľ (napr. kodeín) bránia vykašľovať hlien, ktorý sa po podaní Ambrobene 15 mg/5 ml tvorí vo väčšej miere, preto ich neužívajte súčasne.

Dávkovanie:

Pokiaľ lekár neurčí inak, zvyčajná dávka Ambrobene 15 mg/5 ml je nasledovná:

Dospelí: prvých 2 - 3 dni 3 x 10 ml denne, ďalej 2 x 10 ml alebo 3 x 5 ml denne
Deti: 0 - 2 roky: 2 x 2,5 ml denne
2 - 5 rokov: 3 x 2,5 ml denne
6 - 12 rokov 2 - 3 x 5 ml denne

Spôsob užívania:

Liek sa užíva po jedle a zapíja sa dostatočným množstvom tekutiny, čo významne prispieva k jeho účinku. Odmerka je súčasťou balenia sirupu.

Upozornenie:

V prípade, že počas troch dní nedôjde k zlepšeniu stavu, vyhľadajte svojho ošetrojúceho lekára. Bežným sprievodným javom počas užívania lieku Ambrobene 15 mg/5 ml je zvýšenie tvorby hlienu v prvých 2 - 3 dňoch.

Zvyčajný čas liečby liekom Ambrobene 15 mg/5 ml je 7 - 10 dní.

Liek obsahuje 2,1 g karbohydrátov, ekvivalentných približne 0,175 jednotkám sacharidov v 5 ml sirupu.

Uchovávanie:

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Varovanie:

Liek sa nesmie užívať po uplynutí použiteľnosti (exspirácia) uvedenej na obale.

Uschovávajújte mimo dosahu a dohľadu detí.

Balenie:

100 ml.

Dátum revízie textu:

Marec 2008