

Písomná informácia pre používateľa

CILKANOL
300 mg
tvrdé kapsuly

troxerutín

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znova prečítali.
- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.
- Ak sa do 2 až 4 týždňov nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii dozviete:

1. Čo je Cilkanol a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Cilkanol
3. Ako užívať Cilkanol
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Cilkanol
6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Cilkanol a na čo sa používa

Liečivo troxerutín patrí do skupiny bioflavonoidov. Znižuje priepustnosť krvných vlásočníc, znižuje lámavosť ciev, zlepšuje prekrvenie a výživu tkanív končatín. Prispieva k úľave pri bolesti, pri pocitoch tiaže a únavy v dolných končatinách, pri kŕchoch a pálení v lýtkach. Pôsobí proti opuchom.

Cilkanol užívajú na odporúčanie lekára dospelí a dospievajúci pri chronických ochoreniach žíl na zmiernenie ťažkostí ako sú opuchy, bolesť, svrbenie a kŕče dolných končatín, na podporu hojenia vredov predkolenia a pri hemoroidoch.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Cilkanol

Neužívajte Cilkanol

- ak ste alergický na troxerutín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Upozornenia a opatrenia

- Cilkanol sa nepodáva deťom do 15 rokov.
- Pri povrchovej tromboflebitíde alebo hlbokej flebotrombóze nenahrádza podávanie troxerutínu protizápalový a antitrombotický liečbu.
- Liečebná kúra sa nemá prerušiť aspoň počas 2 - 4 týždňov. Po tomto čase sa o ďalšom užívaní lieku poraďte s lekárom.
- Užívanie lieku Cilkanol pri ochoreniach žíl je len súčasťou komplexnej liečby. Treba dodržiavať ostatné liečebné postupy, ktoré vám odporučil lekár (kompresívna liečba ovínadlom

alebo pančuchou pri kŕčových žilách, dodržiavanie hygienických postupov pri ošetrovaní vredov predkolenia a hemoroidov, a i.).

Iné lieky a Cilkanol

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Doposiaľ nie sú známe žiadne lieky, ktorých účinok by ovplyvňovalo súčasné užívanie Cilkanolu. Napriek tomu neužívajte bez súhlasu lekára súčasne s liekom Cilkanol iné voľnopredajné lieky na liečbu ochorení žil, pretože by mohlo dôjsť k prehĺbeniu ich nežiaducích účinkov.

Cilkanol a jedlo a nápoje

Kapsuly sa užívajú počas jedla, prehľtajú sa celé, nerozhryznuté, zapíjajú sa vodou alebo iným nealkoholickým nápojom.

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčite, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotniť, porad'te sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Cilkanol sa zvyčajne neužíva v tehotenstve. V prípade tehotenstva sa porad'te s lekárom. Počas liečby sa neodporúča dojčiť.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Cilkanol nemá žiadny vplyv na schopnosť viest' vozidlá a obsluhovať stroje.

3. Ako užívať Cilkanol

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Dospelí a dospievajúci zvyčajne užívajú na začiatku liečby 3-krát denne 1 kapsulu, po ústupe ťažkostí 2-krát denne 1 kapsulu.

Ak užijete viac Cilkanolu, ako máte

Pri predávkovaní alebo ak dieťa náhodne požije viac kapsúl, vyhľadajte lekára.

Ak zabudnete užiť Cilkanol

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete užívať Cilkanol

Liečebná kúra sa nemá prerušiť aspoň počas 2 - 4 týždňov.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Tolerancia troxerutínu je veľmi dobrá, vedľajšie účinky sa vyskytujú zriedkavo a sú mierneho charakteru. Ťažkosti zväčša pri ďalšom podávaní ustúpia, výnimcoľne môžu byť dôvodom na prerušenie liečby.

Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)

- bolesti hlavy;
- návaly*;
- ľahká nevoľnosť;

- svrbivá kožná vyrážka.
- * najmä na začiatku liečby

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v [Prílohe V](#). Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Cilkanol

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkostou.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Cilkanol obsahuje

- Liečivo je troxerutín 300 mg v každej tvrdej kapsule.
- Pomocné látky sú makrogol, magnéziumstearát.

Ako vyzerá Cilkanol a obsah balenia

Cilkanol sú žltobiele tvrdé kapsuly obsahujúce žltú náplň.

Veľkosť balenia: 30 tvrdých kapsúl.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Zentiva, k. s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10 – Dolní Měcholupy, Česká republika

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v januári 2016.