

PÍ SOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV NA VONKAJŠOM OBALE

URCYSTON PLANTA

čajovina
urologikum, dezinficiens močových ciest

Zloženie

Uvae ursi folium (medvedicový list) 25.0g, Equiseti herba (prasličková vňať) 20g, Myrtilli herba (čučoriedková vňať) 15g, Chamomillae flos (rumančekový kvet) 10g, Sambuci flos (kvet bazy čiernej) 10g, Solidaginis herba (zlatobyľová vňať) 10g, Thymi herba (vňať dúšky tymiánovej) 10g v 100,0 g čajoviny.

Lieková forma

Čajovina - záparové vrecká 20 x 1,5g

Farmakoterapeutická skupina

Fytofarmakum - urologikum, dezinficiens močových ciest, mierne diuretikum a spazmolytikum

Charakteristika

Hlavným nositeľom liečebného účinku je list medvedice lekárskej. Antibakteriálny účinok medvedice lekárskej je vhodne doplnený ďalšími liečivými rastlinami, ktoré jej účinok zvyšujú a pôsobia priaznivo pri ochorení močovej sústavy.

Dávkovanie a spôsob podania

Vrecko (1,5g) sa zaleje šálkou (1/4l) vriacej vody a vylúhuje v prikrytej nádobe 10 minút. Na zvýšenie účinku sa odporúča pridať k záparu na špičku noža sódu bikarbónu. Čaj sa pije teplý 3 až 5x denne. Pripravuje sa vždy čerstvý, bezprostredne pred použitím.

Nie je určený na dlhodobé používanie. Nepoužívať viac ako 2 týždne. Ak sa príznaky ochorenia počas prvého týždňa užívania zhoršia, kontaktujte lekára.

Liečba sa môže opakovať najviac 5 x ročne.

Nepodávať kyslé jedlá a kyslo reagujúce lieky. Informujte ošetrojúceho lekára, že užívate URCYSTON PLANTA.

Indikácie

Doplnková liečba pri akútnych a infekčných urologických ochoreniach, chronických zápaloch močových ciest, akútnych a chronických zápaloch močového mechúra. Pôsobí antisepticky (protibakteriálne), protizápalovo, podporuje vylučovanie moču a uvoľňuje kŕče hladkých svalov.

Kontraindikácie

Opuchy spôsobené nedostatočnou funkciou srdca a obličiek, tehotenstvo, dojčenie, deti do 12 rokov a precitlivosť na niektorú zložku lieku.

Nežiaduce účinky

U citlivých osôb môže dôjsť k žalúdočným ťažkostiam (nevoľnosť, vracanie) alebo kožné alergické reakcie, ktoré vymiznú po vysadení prípravku

Pri výskyte akýchkoľvek nežiaducich účinkov alebo neobvyklých reakcií prerušte užívanie a poraďte sa s lekárom.

Upozornenie

Môže spôsobiť hnedé zafarbenie moču.

Varovanie

Pri predávkovaní alebo náhodnom požití dieťaťom sa poraďte s lekárom

číslo šarže:

Použiteľné do:

Nepoužívajte po uplynutí dátumu použiteľnosti, ktorý je uvedený na obale.

Uchovávajte na suchom mieste v pôvodnom obale pri teplote do 25°C.

Chráňte pred svetlom.

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Liek nie je viazaný na lekársky predpis.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

LEROS s.r.o.

U Národní galerie 470

156 15 Praha 5-Zbraslav ČR

Registračné číslo

94/0133/89-C/S

EAN kód

Dátum poslednej revízie:

Október 2007