

## **Písomná informácia pre používateľa**

### **Faryngal 5 mg/1 mg lisované pastilky**

Chlórhexidíniumchlorid/lidokaíniumchlorid

**Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.**

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnik.
- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnik. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.
- Ak sa do 3 až 4 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

**V tejto písomnej informácii sa dozviete:**

1. Čo je Faryngal a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Faryngal
3. Ako používať Faryngal
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Faryngal
6. Obsah balenia a ďalšie informácie

#### **1. Čo je Faryngal a na čo sa používa**

Faryngal sú lisované pastilky, ktoré majú lokálny účinok v ústnej dutine a v hltane.

Faryngal lisované pastilky obsahujú antiseptikum (dezinfekčnú látku), chlórhexidíniumchlorid, a lokálne anestetikum (látku proti bolesti), lidokaíniumchlorid, ktoré spolu pôsobia proti infekcii a bolesti.

Faryngal sa používa:

- pri bolestiach hrdla a ochoreniach hltana a ústnej dutiny, ako je zápal ďasien, zápal slizníc v ústach, zápal hltana a afty.

Ak sa do 3 až 4 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

#### **2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Faryngal**

**Neužívajte Faryngal lisované pastilky**

- ak ste alergický na chlórhexidíniumchlorid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),
- ak ste alergický na lidokaíniumchlorid alebo iné amidové lokálne anestetiká,
- nepodávajte deťom mladším ako 6 rokov.

**Upozornenia a opatrenia**

Predtým, ako začnete užívať Faryngal, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnik.

- Faryngal sa nesmie užívať dlhodobo, nepretržite alebo opakovane. Obmedzte jeho použitie len na čas potrebný k úľave od bolesti a podráždenia.
- V prípade bakteriálnej infekcie sprevádzanej horúčkou sa vyžaduje dodatočná liečba.
- V prípade nadmernej dávky (viac ako 20 pastiliek denne) existuje malé riziko zníženia kontroly nad prehĺtaním.

- Neužívajte tento liek, ak máte silnú alergickú predispozíciu (ste náchylný na alergické reakcie).
  - Ak užívate iné lieky. Prečítajte si tiež časť „Iné lieky a Faryngal“.
- Obráťte sa na svojho lekára, ak sa vás týka niektoré z vyššie uvedených upozornení alebo sa vás to týkalo v minulosti.
- Faryngal lisované pastilky neobsahuje cukor a preto je vhodný aj pre pacientov s cukrovkou.

### **Deti a dospievajúci**

Faryngal lisované pastilky nesmú používať deti mladšie ako 6 rokov.

### **Iné lieky a Faryngal**

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete používať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Neužívajte súbežne s inými antiseptikami (dezinfekčnými látkami).

### **Faryngal a jedlo a nápoje**

Nie sú potrebné žiadne zvláštne opatrenia.

### **Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť**

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Ak sa dodržiavajú osobitné upozornenia a opatrenia, Faryngal sa môže užívať počas tehotenstva a dojčenia. Informujte svojho ošetrojúceho lekára, že užívate Faryngal lisované pastilky.

### **Vedenie vozidiel a obsluha strojov**

Faryngal nemá žiaden alebo má zanedbateľný vplyv na vedenie vozidiel a obsluhu strojov.

### **Faryngal lisované pastilky obsahuje sorbitol**

Faryngal obsahuje sorbitol. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku. Sorbitol môže mať mierny laxatívny („preháňací“) účinok.

Energetická hodnota sorbitolu 2,6 kcal/g.

### **Faryngal lisované pastilky obsahuje aspartám**

Faryngal obsahuje aspartám. Obsahuje zdroj fenylalanínu a môže byť škodlivý pre ľudí trpiacich fenylketonúriou.

## **3. Ako používať Faryngal**

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste ničím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Tento liek sa nesmie užívať dlhodobo. Ak sa príznaky vášho ochorenia zhoršia alebo nezlepšia do 3 až 4 dní, obráťte sa na svojho lekára.

Odporúčaná dávka je:

*Dospelí:* 6 až 10 pastiliek denne. Pastilku nechajte pomaly rozpustiť v ústach každé 2-3 hodiny.

*Deti staršie ako 6 rokov:* 3 až 5 pastiliek denne. Pastilku nechajte pomaly rozpustiť v ústach každé 2-3 hodiny.

### **Ak užijete viac Faryngalu, ako máte**

Tento liek je určený na lokálne použitie, má sa však vziať do úvahy možnosť predávkovania omylom (vnútorným užitím tohto lieku) alebo neopatrnosťou, najmä u detí. Pri správnom užívaní je riziko predávkovania minimálne.

V prípade náhodného požitia veľkého množstva lieku okamžite kontaktujte vášho lekára alebo najbližšie pohotovostné oddelenie.

### **Ak zabudnete užiť Faryngal**

Nie sú potrebné žiadne zvláštne opatrenia.

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

### **Ak prestanete užívať Faryngal**

Nie sú potrebné žiadne zvláštne opatrenia.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnik.

## **4. Možné vedľajšie účinky**

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejaví u každého.

- Zriedkavé: alergické reakcie na koži a sliznici (mukózných membránach).
- Výnimočne sa môžu vyskytnúť porucha vnímania chuti, pocit pálenia na jazyku a závažné alergické reakcie (anafylaktické reakcie).
- Pri dlhodobom a nepretržitom užívaní sa môže vyskytnúť hnedé zafarbenie zubov. Avšak toto hnedé zafarbenie sa dá odstrániť.

### **Hlásenie vedľajších účinkov**

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnik alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na **národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V**. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

## **5. Ako uchovávať Faryngal**

Tento liek uchovávajú mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajú pri teplote do 25 °C. Uchovávajú v pôvodnom obale.

Neužívajte tento liek po dátume expirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a blistri po EXP. Dátum expirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

## **6. Obsah balenia a ďalšie informácie**

### **Čo Faryngal 5 mg/1 mg lisované pastilky obsahuje**

- Liečivá sú chlórhexidíniumchlorid 5 mg a lidokaíniumchlorid 1 mg.
- Ďalšie zložky sú sorbitol, stearan horečnatý, aspartám, citrónová aróma 501050 AP0551, draselná soľ acesulfámu.

### **Ako vyzerá Faryngal 5 mg/1 mg lisované pastilky a obsah balenia**

Faryngal 5 mg/1 mg lisované pastilky sú biele až takmer biele mierne škvrnité okrúhle pastilky s príchuťou citróna.

Faryngal je dostupný v škatuľke s obsahom 12, 24 alebo 36 lisovaných pastiliek v perforovanom blistri s jednotlivými dávkami.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

**Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca**

*Držiteľ rozhodnutia o registrácii:*

Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1000 Lubľana

Slovinsko

*Výrobca:*

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1526, Lubľana, Slovinsko

Laboratoria QUALIPHAR N.V./S.A, Rijksweg 9, 2880 Bornem, Belgicko

**Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v 06/2018.**