

## Písomná informácia pre používateľa

### YOMOGI

Min.  $2,5 \times 10^9$  životaschopných buniek v 250 mg lyofilizátu  
suché kvasinky *Saccharomyces cerevisiae* HANSEN CBS 5926  
(synonymum: *Saccharomyces cerevisiae boulardii*)

tvrdé kapsuly

**Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.**

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znova prečítali.
- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkolvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii.  
Pozri časť 4.
- Ak sa do 2 dní nebude cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

**V tejto písomnej informácii a sa dozviete:**

1. Čo je YOMOGI a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete YOMOGI
3. Ako užívať YOMOGI
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať YOMOGI
6. Obsah balenia a ďalšie informácie

#### 1. Čo je Yomogi a na čo sa používa

YOMOGI obsahuje životaschopné kvasinky kultúr z definovaného kmeňa *Saccharomyces cerevisiae boulardii* a používa sa pri hnačke.

*YOMOGI sa používa na*

- liečbu príznakov akútnej hnačky
- na prevenciu a liečbu príznakov cestovateľskej hnačky ako aj hnačky počas výživy žalúdočnou sondou.

YOMOGI je určený pre dospelých a deti vo veku od dvoch rokov.

#### 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete YOMOGI

**Neužívajte YOMOGI**

- ak ste alergický na kvasinky, najmä *Saccharomyces boulardii* alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6);
- ak máte oslabený imunitný systém alebo ste hospitalizovaný (kvôli vážnym ochoreniam alebo zmenenému/oslabenému imunitnému systému);
- ak ste pacient s centrálnym žilovým katétronom (hadička zavedená do centrálnej žily, ktorá slúži na podávanie výživy alebo liekov priamo do krvného obehu).

**Upozornenia a opatrenia**

Pri hnačke trvajúcej viac ako 2 dni alebo ak sa objaví krv v stolici, alebo sa zvýši teplota, vyhľadajte lekára.

Pri hnačkovom ochorení, zvlášť u detí, je najdôležitejším liečbným opatrením pozornosť venovaná príjmu tekutín a elektrolytov. Hnačku u detí konzultujte s lekárom.

Ak je potrebné urobiť mikrobiologické testy stolice počas liečby alebo krátko po nej, laboratórium treba informovať o užívaní tohto lieku kvôli falošne pozitívny výsledkom.

#### **Deti**

Nie sú dostupné adekvátne štúdie o použití tohto lieku u dojčiat a malých detí.  
Preto sa tento liek nemá podávať deťom do 2 rokov.

#### **Iné lieky a YOMOGI**

Súbežné užívanie YOMOGI a antimykotík (liekov proti kvasinkám a plesni) môže porušiť účinok YOMOGI.

Súbežné užívanie inhibítarov monoaminoxidázy (lieky proti depresii) môže zvýšiť krvný tlak.

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

#### **YOMOGI a jedlo a nápoje**

Nie sú žiadne interakcie s jedlom a nápojmi.

#### **Tehotenstvo a dojčenie**

Ak ste tehotná alebo dojčite, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotniť, poradte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.  
Vzhľadom na nedostatok údajov sa užívanie lieku počas tehotenstva a dojčenia neodporúča.

#### **Vedenie vozidiel a obsluha strojov**

Žiadne zvláštne opatrenia nie sú potrebné.

#### **YOMOGI obsahuje laktózu**

Ak vám váš lekár povedal, že trpíte neznášanlivosťou niektorých cukrov, kontaktujte svojho lekára predtým, ako začnete užívať tento liek.

### **3. Ako užívať YOMOGI**

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

#### *Dávkovanie*

Ak váš lekár nepredpísal iné dávkovanie, zvyčajná dávka pre deti staršie ako 2 roky a dospelých je:

- na liečbu hnačky 1 kapsulu 1 až 2krát denne.
- na prevenciu cestovateľskej hnačky 1 kapsulu 1 až 2krát denne 5 dní pred začiatkom cesty
- na hnačku vyvolanú podávaním výživy cez žalúdočnú sondu, 750 mg denne (obsah 3 kapsúl) v 1,5 litri roztoku výživy

#### *Spôsob podávania*

Kapsulu užívajte celú a nerozhryzenú, s dostatočným množstvom tekutiny (najlepšie pohárom vody) pred jedlom.

U detí do 6 rokov ako aj u pacientov vyživovaných sondou sa tvrdá kapsula otvorí ľahom od seba a obsah sa zamieša do jedla alebo tekutiny (izbovej teplote) resp. do roztoku výživy.

Pri hnačke spôsobenej výživovou sondou sa obsah kapsuly len pridá k roztoku výživy.

### *Dĺžka liečby*

Liečba hnačky má pokračovať ešte niekoľko dní po ústupe symptómov.

V princípe nie sú známe žiadne obmedzenia týkajúce sa dĺžky užívania prípravkov obsahujúcich kvasinky.

Venujte, prosím, pozornosť odporúčaniam v časti „Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete YOMOGI“ a „Možné vedľajšie účinky“.

Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika, ak máte pocit, že účinok YOMOGI je príliš silný alebo slabý.

### **Ak užijete viac YOMOGI, ako máte**

Predávkovanie prípravkami obsahujúcimi kvasinky sa doposiaľ nehlásili.

Ak ste užili viac YOMOGI, ako je odporúčané, povedzte to svojmu lekárovi, ktorý rozhodne, či sú potrebné ďalšie opatrenia.

Nižšie uvedené vedľajšie účinky sa môžu vyskytnúť vo zvýšenej miere.

### **Ak zabudnete užiť YOMOGI**

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Pokračujte v užívaní YOMOGI, ako vám predpísal lekár alebo ako je uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.

### **Ak prestanete užívať YOMOGI**

Môžete prestať YOMOGI užívať kedykoľvek, pretože skončenie liečby vo všeobecnosti nie je považované za škodlivé.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

## **4. Možné vedľajšie účinky**

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Počas užívania YOMOGI sa u vás môžu vyskytnúť nasledovné vedľajšie účinky zoradené do skupín podľa častoty ich výskytu:

#### **Veľmi zriedkavé** (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb):

- prenikanie kvasiniek do krvi (fungémia).

#### **Neznáme** (častosť výskytu sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):

- užívanie tohto lieku môže spôsobiť flatulenciu (nadúvanie),
- reakcie z precitlivenosti v podobe svrbenia, žihľavky, miestneho alebo celkového výsevu vyrážok na koži,
- môže sa objaviť angioedém, dýchavičnosť a anafylaktický šok.

### **Ako postupovať v prípade výskytu vedľajších účinkov**

Ak sa u vás vyskytne niektorý z vyššie uvedených vedľajších účinkov, najmä opuch slizníc v tvárovej oblasti a opuch hrdla (angioedém), dýchavičnosť alebo príznaky alergického šoku, prestaňte tento liek užívať a ihned o tom informujte svojho lekára, ktorý rozhodne o stupni závažnosti a môže prijať vhodné liečebné opatrenia.

Po prvom výskyti reakcie z precitlivenosti nesmiete viac YOMOGI užívať.

### **Hlásenie vedľajších účinkov**

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na **národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V**. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

### **5. Ako uchovávať YOMOGI**

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a blistri.  
Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Tento liek uchovávajte v pri teplote do 25 °C!

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne.  
Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

### **6. Obsah balenia a ďalšie informácie**

#### **Čo YOMOGI obsahuje**

Liečivo je: suché kvasinky *Saccharomyces cerevisiae* HANSEN CBS 5926  
(synonymum: *Saccharomyces cerevisiae boulardii*)

1 tvrdá kapsula obsahuje:

Min.  $2,5 \times 10^9$  životaschopných buniek *Saccharomyces cerevisiae* HANSEN CBS 5926  
(synonymum: *Saccharomyces cerevisiae boulardii*) v 250 mg lyofilizátu

Ďalšie zložky sú: bezvodá laktóza, monohydrát laktózy, magnéziumstearát, želatína, voda, chlorofylín-med'natý komplex (E 141), oxid titaničitý (E 171), hydrát oxidu železitého (E 172).

Pre diabetikov – užitie 1 kapsuly YOMOGI treba počítať ako príjem 0,01 sacharidových jednotiek.

#### **Ako vyzerá YOMOGI a obsah balenia**

*Vzhľad:*

bledo zelené / žlté tvrdé kapsuly

*Balenie:*

YOMOGI je dostupný v nasledovných baleniach:

10 tvrdých kapsúl

20 tvrdých kapsúl

50 tvrdých kapsúl

100 tvrdých kapsúl

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

#### **Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca**

Ardeypharm GmbH, Loerfeldstr. 20, 58313 Herdecke, Nemecko

**Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v novembri 2019.**